

Contre-indications

- Chimiothérapie
- Nutrition parentérale(seulement « périkabiven » possible)
- Injection de produits vésicants ou irritants dont le pH est <5 ou >9
- Solutés hypertoniques
- Lésions cutanées infectieuses et/ou suintantes sur le bras à perfuser
- Présence d'un curage ganglionnaire où une radiothérapie a été réalisé, ou sur lequel une tumeur maligne a été diagnostiquée
- Fistule artério-veineuse sur le bras à perfuser (ou projet à court terme)
- Mise en place en regard d'une prothèse orthopédique ou sur un membre paralysé

Nb : La présence d'un traitement anticoagulant n'est pas une contre-indication en soi

Numéros utiles

Permanence Midline : 04.91.61.75.53

Accueil Hôpital HIA Laveran : 04.91.61.71.00

En cas d'urgence appelez le SAMU : 15

Prise de Rendez-vous

Pour votre patient (réservé aux professionnels)

Directement sur l'application



Ou Flashez ce QR code



HIA LAVERAN QGR-INS-631 v1
Du 01/08/2023



**POSE DE CATHÉTER
MIDLINE
EN AMBULATOIRE**



Le MIDLINE

Avantages

Accès vasculaire prolongé sans cathéter central

Le Midline offre un accès vasculaire prolongé sans nécessiter de cathéter central, ce qui réduit les ponctions veineuses et facilite les traitements à moyen terme.

Confort accru grâce à l'insertion profonde

Il procure un plus grand confort au patient grâce à son insertion dans des veines périphériques plus profondes, lui permettant une meilleure mobilité et réduisant les risques d'irritation et d'inconfort.

Préservation des veines centrales

Le Midline préserve les veines centrales, évitant ainsi les complications associées à l'utilisation de cathéters centraux et permettant de les réserver pour des interventions plus complexes.

Réduction des complications

Son utilisation réduit les risques de complications tels que les infections, par rapport à une voie centrale.

Gestion paramédicale

Le Midline est un dispositif médical que l'infirmier peut gérer seul au domicile du patient.

Son retrait ne nécessite pas de présence médicale et se fait sur le lieu de vie du patient.

Indications générales

• **Traitement intraveineux supérieur ou égal à 7 jours et inférieur à 28 jours**

(solution pH 5 à 9, osmolarité inférieure à 900 mOsm/l)

• **Prélèvement sanguin régulier**

• **Difficulté d'accès veineux**

La pose d'un Midline peut se justifier dès la présence d'au moins une de ces indications.

Algorithme décisionnel

